

CONOCIMIENTO SOBRE CÁNCER CERVICOUTERINO Y LAS PRÁCTICAS QUE SON RECONOCIDAS COMO PREVENTIVAS POR MUJERES DEL DEPARTAMENTO SAN CRISTOBAL

Montyn, Juan

Facultad de Ciencias Médicas-UNL

Director/a: Blesio, Hernán

Codirector/a: Kuttel, Yelena

Área: Ciencias de la Salud

Palabras claves: Papanicolau, Vacunación, Población rural.

INTRODUCCIÓN

El cáncer es un problema de salud global. Las enfermedades neoplásicas aparecen entre las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Entre éstas destaca el cáncer de cuello uterino. A nivel mundial ocupa el segundo lugar en incidencia y mortalidad por cáncer entre mujeres de todas las edades (Ferlay et al. 2020). En Argentina, representa el quinto lugar de muerte por cáncer y el tercero en incidencia, siendo el tumor ginecológico más frecuente luego del cáncer de mama. No obstante, es una de las neoplasias con el mayor potencial de prevención primaria y secundaria. En países en vías de desarrollo, y en particular América Latina, los resultados obtenidos tras la implementación de programas de prevención no han sido esperanzadores. Según un informe elaborado por el Observatorio Global de Cáncer de la OMS, más del 90% de las muertes estimadas por cáncer de cuello uterino en 2020 tuvieron lugar en los países de ingresos bajos y medianos. Esta situación es extrapolable con lo que sucede en nuestro país y en nuestra provincia, siendo apropiada una meticulosa revisión y monitoreo, en el caso de existir, de los programas aplicados. En este contexto, la accesibilidad a dichos programas prima entre los aspectos a ser evaluados. Frente a esto, se plantea valorar la accesibilidad como un proceso dinámico de interacción entre el sistema de salud y la población destinataria, siendo el conocimiento de la problemática un factor clave en la toma de decisión de las personas (Ampofo et al. 2022).

Título del proyecto: BARRERAS QUE INFLUYEN EN LA DETECCIÓN PRECOZ, EL TRATAMIENTO Y EL SEGUIMIENTO DE LAS MUJERES CON CANCER GENITO MAMARIO Instrumento: CAID Año convocatoria: 2022 Organismo financiador: UNL Director/a: Seiref Samuel

OBJETIVOS

- Valorar el grado de conocimiento acerca del cáncer cervicouterino de mujeres de las localidades de Capivara, Santurce, Ñanducita y La Lucila
- Conocer qué prácticas, estas mujeres, reconocen como preventivas.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo transversal que incluyó mujeres mayores de 18 años pertenecientes a las localidades de Capivara, Santurce, La Lucila y Ñanducita del departamento San Cristóbal de la provincia de Santa Fe. Estas localidades están conformadas por poblaciones rurales cuya composición es menor a 100 mujeres por localidad de acuerdo al reporte del Sistema de Información de los Centros de Atención Primaria (SICAP) de junio de 2022. Todas poseen un centro de atención primaria de la salud referenciado al SAMCO de la ciudad de San Cristóbal. En cada localidad las mujeres fueron convocadas para la realización de un taller de salud sexual y reproductiva. A las asistentes se les realizó una encuesta estructurada, voluntaria y anónima para evaluar el grado de conocimientos acerca del cáncer de cuello uterino. El cuestionario fue evaluado y aprobado por un comité de expertos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral y posteriormente validado en cuanto a comprensión, practicidad y tiempo de aplicación. De igual manera, la herramienta fue sometida a evaluación por el comité de Bioética de dicha institución. El instrumento fue aplicado previo consentimiento informado y bajo la tutela de un personal capacitado.

El cuestionario constó de 2 partes. En la primera se recogieron datos filiatorios y antecedentes gineco-obstétricos. La segunda parte fue dirigida a evaluar el grado de conocimientos sobre el cáncer cervicouterino. Fueron excluidas las mujeres con cáncer de cuello uterino presente o pasado. El grado de conocimientos fue categorizado en inadecuado, adecuado o muy adecuado. Para alcanzar el nivel de conocimiento adecuado las voluntarias debieron responder correctamente al menos el 60% de las preguntas con dos aciertos en cada área evaluada (generalidades, prevención primaria y prevención secundaria). Para lograr un nivel de conocimiento muy adecuado las participantes debieron responder al menos un 75% de las preguntas correctamente con dos aciertos en cada área. Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS v28.0. El análisis de relación entre dos variables cualitativas se llevó a cabo mediante el test Chi cuadrado de Pearson. La significancia estadística se fijó con un valor alfa igual a 0,05. Se utilizaron intervalos de confianza del 95%.

RESULTADOS

La población muestral incluyó un total de 52 mujeres. El rango de edad de las participantes fue de 18 a 61 años con una media en 36 años. El 71,2% (N=37) manifestó acceder al sistema

de salud pública. La consulta al médico más frecuente fue el control 61,5%, (N=32); el 38,5% (N=20) refirió acudir ante la presencia de signo sintomatología.

El nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino se presenta en la Figura 1. El 63,5% (N=33) relacionó el desarrollo de lesiones precursoras con tener antecedentes familiares de cáncer de cuello uterino. La infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) fue reconocida como factor de riesgo por el 40,4% (N=21).




Figura 1. Nivel de conocimiento acerca del cáncer cervicouterino.

En relación a las medidas reconocidas como preventivas, el 44,2% (N=23) refirió no conocer ningún método de detección precoz del cáncer cervicouterino; siendo el Papanicolaou el método más citado por el restante porcentaje. Respecto de la vacunación, pese a que el 67,3% (N=35) no conocía la vacuna del VPH y su efecto preventivo contra el cáncer, el 96,2% (N=50) manifestó su voluntad de colocársela. El 50% (N=26) reconoció el efecto protector del preservativo en el desarrollo de procesos neoplásicos cervicouterinos.

Por otro lado, se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el conocimiento de las personas y su edad. Las mujeres comprendidas en el rango etario de los 18 a los 40 años obtuvieron mejores resultados en el cuestionario de evaluación de conocimiento en comparación con aquellas mayores de 40 (Figura 2).




Figura 2. Conocimiento por grupos etarios.

CONCLUSIONES

La población estudiada mostró un bajo nivel de conocimiento acerca del cáncer cervicouterino. La inmunización frente al VPH y las prácticas sexuales seguras fueron pobremente reconocidas como formas de prevenir esta enfermedad. No obstante, la actitud frente a la vacunación fue positiva. La edad de las pacientes fue un factor condicionante del conocimiento acerca de la problemática.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- **Ampofo, A. G., Boyes, A. W., Khumalo, P. G., & Mackenzie, L. 2022.** Improving knowledge, attitudes, and uptake of cervical cancer prevention among female students: A systematic review and meta-analysis of school-based health education. *Gynecologic oncology*, 164(3), 675–690.
- **Gonsalves, L., Hunter, E. C., Brizuela, V., Tucker, J. D., Srinivas, M. L., Gitau, E., Mercer, C. H., Bajos, N., & Collins, D. 2021.** Cognitive testing of a survey instrument to assess sexual practices, behaviours, and health outcomes: a multi-country study protocol. *Reproductive health*, 18(1), 249.
- **Kirubarajan, A., Leung, S., Li, X., et al. 2021.** Barriers and facilitators for cervical cancer screening among adolescents and young people: a systematic review, *BMC Womens Health* 21 122, 2021/03/25 <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01264-x>
- **McLaughlin, H., Hamis, K., Goldsmith, A., Allshouse, A. 2022.** Accessing gynecologic oncology care: A comparison of rural and urban gynecologic cancer patients. *Gynecologic Oncology*. Volume 164(1), 26-27.