

**AVIFAUNA MENDOCINA, I: *Geothlypis aequinoctialis velata*  
Viellot y *Colibri coruscans coruscans* (Gould) (Aves: Parulidae y  
Trochilidae) \***

JULIO R. CONTRERAS \*\*

Y  
ANA FERNANDEZ  
Laboratorio Fauna Silvestre  
IADIZA - C. C. 507 - (5500) Mendoza  
Argentina

R E S U M E N

*Se registró la presencia, en la prov. de Mendoza, de *Geothlypis aequinoctialis velata* ("arañero de cara negra") y de *Colibri coruscans coruscans* ("picaflor de vientre azul"). Ninguna de estas especies había sido dada previamente para esta región. Para la primera se discute el posible carácter migratorio de las poblaciones anidantes en Mendoza y se dan datos métricos y descriptivos de una serie de ejemplares. La presencia de la segunda sería solo ocasional en esta Provincia*

S U M M A R Y

**Avifauna in the Province of Mendoza, I: *Geothlypis aequinoctialis velata* Viellot and *Colibri coruscans* (Gould) (Aves: Parulidae and Trochilidae).**

Specimens of the yellowthroat, *Geothlypis aequinoctialis velata*, and the sparkling violetear, *Colibri coruscans*, were obtained from the Province of Mendoza, where its distribution was previously unknown. The masked yellowthroat is a summer resident, nesting in the dense vegetation bordering the irrigation channels in the cultivated area of Central Mendoza, and the sparkling violetear is a rare winter of the Parque General San Martín, in the City of Mendoza.

---

\* Trabajo presentado en la Reunión de Comunicaciones Científicas del 1/4/78.

\*\* Miembro de la Carrera del Investigador Científico (CONICET).

## GEOTHYLPS AEQUINOCTIALIS VELATA Vieillot

El hallazgo de una abundante población del "arañero de cara negra (*Geothlypis aequinoctialis velata*) en las cercanías de Rodeo del Medio y Primavera (Dep. Guaymallén), permite extender hasta la longitud media de la Prov. de Mendoza la distribución de este interesante parúlido, al que hasta ahora se reconocía para el "norte hasta Santa Fe, Córdoba y La Rioja (Navas, 1959; Ochoa de Masramón, obs. inéd.). Se lo considera como un componente típico de la avifauna chaqueña, de carácter no migratorio (Wetmore, 1926; Short, 1975), pero existen evidencias de que, en las zonas marginales de su distribución, sería un residente de verano acerca de cuya nidación local aún no hay datos. Así, para Giacomelli (1907) es "común en la primavera en la Capital (de La Rioja)" y para Ochoa de Masramón "sólo se observa en primavera y verano". Lo mismo sucedería en Mendoza, donde se comprobó su presencia, además de Guaymallén, en Laguna del Vitorón (Dep. Maipú) y en Gustavo André (Dep. Lavalle, a orillas del río Mendoza), en verano, registrándose fehacientemente su ausencia durante el invierno.

Entre el material de *G. aequinoctialis velata* existente en la colección del IADIZA hay un ejemplar de Canal 6, Delta del Paraná, Partido de Campana, Prov. Buenos Aires (Massoia-De Simone leg., 20/XII/76) y representa una de las pocas citas documentadas para esa provincia después de la de Hartet y Venturi (1909) para Barracas al Sur, donde anidaba en aquella época. Tanto nuestro espécimen como el de aquellos autores y los de Zotta (1936 y 1940), son de primavera tardía, verano u otoño temprano, por lo tanto no hay certeza alguna sobre su carácter sedentario.

En Mendoza, representaría un elemento más entre los muchos que, en la fauna de vertebrados, penetran con la llamada "corriente florística chaqueña (Roig y Roig, 1969) por el sector noreste de la provincia. Tal como lo caracterizan los datos bibliográficos (Zotta, 1936 y 1940; Berla, 1944), corroborados por la observación de los contenidos del aparato digestivo de los ejemplares coleccionados en Mendoza y en Corrientes, es un activo insectívoro especializado en coleópteros (principalmente Curculionidae, Chrysomelidae y Scarabaeidae), en lepidópteros (Noctuidae), hemipteros (Membracidae), himenópteros y dípteros, todos ellos de pequeño tamaño y especialmente formas adultas, a las que devora finamente trituradas.

La descripción de la subespecie, basada en el lote diez de ejemplares mencionados más adelante, es la siguiente: cabeza con frente y corona grises, nuca olivácea, rostro, orum, región ocular y coberto-

ras auriculares negras; garganta y cuello amarillos. Dorso y rabadilla verde oliváceo. Alas con cobertoras menores, medianas y mayores de color verde gris oliváceo, remiges primarias pardo-grisáceas con el borde externo del limbo exterior amarillo en la primera y verde oliva en las siguientes; por debajo amarilla en su tercio proximal y gris en el resto. Cola por debajo y arriba de color gris-oliváceo con reflejo verdoso, remiges con raquis pardos por arriba y blanco-amarillentos por debajo. Pecho y vientres amarillos, al igual que los lados del cuerpo y las cobertoras caudales inferiores. Iris pardo, maxilar negro con el reborde inferior de color córneo claro en sus dos tercios basales. Mandíbula blanco córneo en su base y ventralmente, tornándose oscura, casi negra, hacia la punta. Patas rosado córneo, con las articulaciones entre placas oscuras.

La hembra carece de las partes negras de la cabeza, que en ella son del color del dorso. La corona, en vez de gris es olivácea; el ala es ligeramente más corta. El macho joven es como la hembra. Las medidas y el peso de los ejemplares estudiados se indican en el cuadro N° 1 y corresponden a las siguientes localidades: A-004039 y A-004065 = Paso Mbaracayá, Rincón Sta. María, Dep. Ituzaingó, Prov. Corrientes; A-003782 en las afueras ciudad Paraná, Dep. Capital, Prov. Entre Ríos; A-003560 = Canal 6, Delta del Paraná, Partido de Campana, Prov. Buenos Aires; los restantes ejemplares proceden todos de Primavera, Dep. Guaymallén, Prov. Mendoza.

**Cuadro N° 1** — Los números corresponden a la colección ornitológica del IADIZA. Todas las medidas están dadas en mm y el peso en g. Culmen: se expresa sucesivamente su longitud total y descubierta; Ala: la primera medida corresponde a "flat" y la otra a cuerda. **Abreviaturas:** LT = largo total, E = envergadura.

Nº	Sexo	LT	E	Ala	Cola	Culmen	Tarso	Peso
A-004039	M	150	190	59,0-58,0	55	14,6-11,4	20,6	11,5
A-004046	M	144	194	60,0-59,0	54	14,3-11,2	20,3	15,5
A-003760	M	144	197	62,0-61,0	55	14,5-11,6	21,4	12,0
A-003782	M	141	194	59,1-58,0	53	14,8-11,5	20,5	12,8
A-003560	M	146	—	63,0-62,0	56	14,4-11,6	19,8	12,0
A-003788	M	147	196	60,0-59,0	54	14,4-11,1	20,0	13,8
A-003692	M	138	198	60,0-59,5	56	14,8-11,2	20,5	13,2
A-003827	M	145	195	60,0-59,0	54	14,6-11,3	20,4	12,8
A-003831	M	151	199	63,5-62,0	55	14,8-11,6	20,8	13,1
A-004065	H	143	189	58,0-57,0	54	14,5-11,4	19,0	10,8

## COLIBRI CORUSCANS CORUSCANS (Gould)

Conocido vulgarmente bajo el nombre de "picaflor de vientre azul", está distribuido en los sectores andino, subandino y serrano central de Argentina, desde Jujuy hasta Catamarca y Tucumán (Olrog, 1959), sin que hasta ahora se hayan mencionado registros más meridionales.

El 14 de junio de 1977 se obtuvo un ejemplar de esta especie en el Parque Gral. San Martín de la ciudad de Mendoza, entre la arboleda densa, después de observar durante varios días otros ejemplares más, que se mantuvieron en la zona hasta los primeros días del mes de julio, en convivencia cercana con *Sapho sparganura*

Se eleva así a cinco el total de Trochilidae conocidos para la provincia de Mendoza, que son *Colibri coruscans coruscans*, *Chlorophilbon lucidus anniventris*, *Oreotrochilus leucopleurus*, *Patagona gigas* y *Saphanoides galcritis*

El ejemplar obtenido está depositado en la Colección Ornitológica del IADIZA (Nº A-003248) y se trata de una hembra adulta, cuyas dimensiones son las siguientes: largo total: 135 mm; ala ("flat"): 72,0 mm; ala (cuerda): 70,0 mm; cola: 47,0 mm; culmen total: 29,8 mm; culmen descubierto: 24,8 mm. Peso: 7,2 gramos.

## BIBLIOGRAFIA

- Berla, H. F. 1944. Lista das aves coleccionadas em Pedra Branca. Municipio de Parati, Estado do Rio de Janeiro, com algunas notas sobre sua Biologia. *Bol. Mus. Nac., Zool.*, 18: 1-21.
- Giacomelli, E. 1907. Catálogo sistemático de la avifauna riojana. *An. Soc. Cient. Arg.*, 63: 280-303.
- Hartet, E. y S. Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novit. Zool.*, 16: 159-267.
- Meyer de Schauensee, R. 1971. A guide to the birds of South America. Oliver & Boyd, Edinburgh, 470 pp.
- Navas, J. R. 1959. Lista preliminar de las aves del Parque Nacional comechingones. p. 77-79, en M. J. Dimitri: La protección de la flora en el noreste de San Luis, *An. Parques Nac.*, 8: 63-94.
- Ochoa de Masramón, D. Aves del noreste de San Luis.
- Olrog, C. C. 1959. Las aves argentinas. Una guía de campo. *Inst. Miguel Lillo*, San Miguel de Tucumán, 345 pp.
- Olrog, C. C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. *Opera ... Lillo.*, 9: 1-377.
- Roig, F. y V. G. Roig. 1969. Nuevos datos sobre la corriente florística chaqueña en Mendoza y observaciones sobre *Aspidosperma quebracho-blanco* en el oeste de su dispersión. *Rev. Fac. C. Agr.*, 15 (1): 46-52.
- Short, L. L. 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 154 (3): 163-352.
- Wetmore, A. 1926. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay, Uruguay and Chile. *Bull. U. S. Nat. Mus.* (133): 1-448.
- Zotta, A. 1936. Notas sobre el contenido estomacal de algunas aves. *Hornero*, 6 (2): 261-270.
- Zotta, A. 1940. Notas sobre el contenido estomacal de algunas aves. *Hornero*, 7 (3): 402-411.

---

Recibido para su publicación el 23-2-78.