



DURACION DEL PERIODO REPRODUCTIVO DE *Netta peposaca* (AVES: ANATIDAE) EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA

Gabriel Angel Marteleur (*)

Juan Carlos Rozzatti (*)

Rafael Carlos Lajmanovich (**)

RESUMEN. Se estudió un área ubicada entre los departamentos Garay y San Javier (Provincia de Santa Fe). El seguimiento se realizó durante 3 temporadas reproductivas, entre agosto de 1989 y abril de 1992. Se capturaron 122 machos. Se obtuvo la relación entre el desarrollo gonadal, las precipitaciones y el régimen hidrométrico, evidenciando la marcada importancia del inicio de las lluvias en el comienzo de la reproducción.

ABSTRACT. Reproductive period duration of *Netta peposaca* (Aves: Anatidae), in Santa Fe Province, Argentine.

The reproductive period duration of *Netta peposaca* in an area of the Garay and San Javier departments (Santa Fe Province) was studied. The survey was carried out during 3 reproductive seasons between august 1989 and april 1992 along which 122 males were catched. The relationship between the gonadal development, the precipitations and the hydrologic regime was obtained. Hence, it was observed the remarkable importance of the rains period start on the reproduction beginning.