



NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA LAS PROVINCIAS DE SANTA FE Y CORRIENTES, REPUBLICA ARGENTINA

Jorge Luis Baldo (*), Mariano Ordano (*), Yanina Arzamendia
y Alejandro Raúl Giraudo (*)

Cátedra de Biodiversidad Animal
Facultad de Cs. Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba
Avda. Vélez Sarsfield 299 - 5000 Córdoba, Argentina.

RESUMEN. Se comunican tres nuevas especies de aves para la provincia de Santa Fe (*Pluvialis squatarola*, *Polytmus guainumbi* y *Casiornis rufa*) y una nueva para la provincia de Corrientes (*Columba speciosa*). Se confirma la presencia de otras dos integrantes de la avifauna de dichas provincias (*Cyanocorax cyanomelas* y *Sporophila leucoptera*, respectivamente) y se da a conocer un registro de una poco conocida en nuestro país (*Tyrannus tyrannus*).

ABSTRACT. New records of birds in the Santa Fe and Corrientes provinces, Argentina.

New records of birds in Santa Fe Province (*Pluvialis squatarola*, *Polytmus guainumbi* y *Casiornis rufa*), and Corrientes Province (*Columba speciosa*) are given. Also the presence of *Cyanocorax cyanomelas* and *Sporophila leucoptera* was confirmed in Santa Fe and Corrientes Provinces, respectively. Furthermore a new record of *Tyrannus tyrannus*, a species poorly known in Argentina is given.

Pluvialis squatarola (L. 1768)

Se observaron 2 ejemplares el 16 de noviembre de 1991, en Playa Norte, Laguna Setúbal, ciudad de Santa Fe (31° 09' S 60° 43' W), en las playas de arena que se observan cuando sus aguas están en bajante.

Migratoria del Artico, fue citada para las costas de Argentina, llegando regularmente hasta Buenos Aires (Olrog, 1959, 1968, 1979, 1984; Meyer de Schauensee, 1966, 1982) y Tierra del Fuego (Olrog, 1979). En el interior del

(*) Becario del CONICET

país ha sido registrada ocasionalmente en la Laguna Mar Chiquita (Olrog, 1979; Nores e Yzurieta, 1980; Nores *et al.*, 1983) y Cruz del Eje (Nores e Yzurieta, *op. cit.*; Nores *et al.*, *op. cit.*). Morrison y Ross (1989) la citan para la región de la Isla Trinidad, Bahía Blanca (Buenos Aires). Morrison y Ross (*op. cit.*) y Bergkamp (1992-1993) la citan para San Antonio Oeste (Río Negro). Sin embargo, Canevari *et al.* (1991) señalan que en verano se encuentra en toda la Argentina pudiendo llegar hasta Tierra del Fuego.

Columba speciosa Gmelin, 1789.

Fue observada una pareja el 11 de noviembre de 1993 en la Ea. La Mansión, 5 km al Sur de Empedrado (28° 02' S 58° 49' W), Dpto. Empedrado, Corrientes. Se hallaban posados en la punta de un árbol seco, a unos 12 m de altura, al borde de una isleta de bosque alternando con campos abiertos y que presentaba elementos arbóreos autóctonos (*Enterolobium contortisiliquum*, *Ocotea* sp., *Peltophorum dubium*, *Eugenia edulis*, *Chorisia* sp.) e introducidos (*Melia azedarach*, *Tipuana tipu*, *Eucalyptus* sp.).

Los registros para Argentina son escasos. Fue citada para Santa Fe (Zotta, 1939; Giai, 1950), Misiones (Olrog, 1963; Navas y Bó, 1986; Chébez, 1992). Además fue avistada en el oeste de la provincia del Chaco por O. Putzolo (Contreras *et al.*, 1990).

Short (1975) la considera presente en Argentina a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná, en Santa Fe y Misiones. Olrog (1979) y Navas y Bó (*op. cit.*) la consideran como una forma ocasional o

extralimital en nuestro país. Giai (*op. cit.*) y Sick (1984) mencionan que se observa en copas y este último autor dice que habita en bosques, en regiones cálidas.

Polytmus guainumbi (L. 1766)

Dos ejemplares machos fueron observados, uno el 8 de enero de 1995 y otro el 5 de febrero de 1995 en la ciudad de Santa Fe (31° 36' S, 60° 36' W), Dpto. Capital, Santa Fe. Se hallaban libando flores de *Hibiscus* sp., *Fuchsia* sp. y una bignoniácea entre 1 y 2 m de altura, en el patio de una casa situada junto al Parque Juan de Garay de esa ciudad.

La especie era conocida para Corrientes (Esteban, 1947; Olrog 1959, 1968, 1979, 1984; Short, 1971, 1975; Narosky e Yzurieta 1987; De la Peña, 1994; Canevari *et al.*, 1991; Contreras *et al.*, *op. cit.*), Buenos Aires (Meyer de Schauensee, 1982), Misiones (De la Peña, 1978), Formosa (Short 1975; Contreras *et al.*, *op. cit.*; De la Peña, *op. cit.*), Chaco (Contreras *et al.*, *op. cit.*; De la Peña, *op. cit.*), y fue citada para Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, donde también se avistó en jardines (Rovira y Beltzer, 1992).

Casiornis rufa (Vieillot, 1816)

Fue observado un ejemplar el 10 de agosto de 1993 en la desembocadura del Arroyo El Sombrerito en el Arroyo Los Amores, 4 km al E de El Sombrerito (59°24'S 28°43'W), Dpto. Gral. Obligado, Santa Fe.

Se encontraba a media altura en los árboles, dentro del bosque. Ha sido citada

para Salta, Jujuy, Chaco y Corrientes (Meyer de Schauensee, 1966; Olrog 1979), Tucumán y E de Formosa (Olrog, *op. cit.*), Santiago del Estero (Nores e Yzurieta 1986; Nores *et al.* 1991, Salvador y Eroles, 1994) y Misiones (Giraud *et al.*, 1993).

Tyrannus tyrannus (L. 1758).

Fue observado un ejemplar el 10 de noviembre de 1993, en el Paraje Mbarigüf, Berón de Astrada, Dpto. homónimo, Corrientes (27°33'S 57°31'W). Se hallaba posado en un timbó (*Enterolobium contortisiliquum*). Al ser espantado, se posaba en la parte media y alta de la copa de los árboles.

Migratoria de Norteamérica, fue citada para Corrientes por Partridge (1963), Tucumán (Meyer de Schauensee, 1966; Olrog, 1979), Islas Malvinas (Léveque, 1978), Formosa y Jujuy (Olrog, *op. cit.*), Misiones (König, 1979; Narosky, 1983), Salta (Salvador y Salvador, 1990), Chaco (Canevari *et al.*, *op. cit.*) y San Juan (Haene y Ostrosky, 1993). Olrog (1979) señala que es visitante regular y no ocasional, y posteriormente, el mismo autor (Olrog 1984) indica que aparece más o menos regularmente en bosques y sabanas entre octubre y marzo. Ridgely y Tudor (1994) señalan que habita en el dosel y bordes de selvas húmedas y bosques secundarios, en claros, pasturas y parques, y que en la migración, puede presentarse casi en cualquier lugar.

Cyanocorax cyanomelas (Vieillot, 1818)

Se observaron 3 ejemplares el 10 de agosto de 1993 en la desembocadura del Arroyo El Sombrerito en el Arroyo Los

Amores, 4 km al E de El Sombrerito, Dpto. Gral. Obligado, Santa Fe.

La presencia de esta especie en el norte de Santa Fe resulta confusa en la literatura, ya que si bien fue citada por Zotta (1940), Olrog (1963), Ridgely y Tudor (1989) y Canevari *et al.* (*op. cit.*), fue omitida por Olrog (1979), Narosky e Yzurieta (1987) y De la Peña (1989). Este registro confirma su presencia en la provincia.

Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817)

Se observó un ejemplar macho el 5 de junio de 1992 en la Laguna Pampfín (27°28'S 58°48'W), Dpto. Capital, Corrientes; y en varias oportunidades en febrero de 1993, en densos pajonales de *Panicum grumosum*, en islas del río Paraná próximas a la Granja Modelo Yatay (27°25'S 58°44'W), Dpto. Capital, Corrientes.

Además, fue observado un macho el 30 de julio de 1994 en el Area Protegida Mburucuyá (28°02'S 58°02'W), Dpto. Mburucuyá, Corrientes, a orillas del Estero Santa Lucía, en un arbustal de *Sapium haematospermum*.

Darrieu (1984) cita un ejemplar coleccionado por W. H. Partridge en Concepción, Corrientes, en 1961. Posteriormente, Contreras (1987) la menciona en una lista preliminar de la avifauna correntina. La especie fue citada, además, en Argentina para Formosa, Chaco y N de Santa Fe (Meyer de Schauensee, 1966; Olrog, 1979; Narosky e Yzurieta, 1987; De la Peña, 1989; Ridgely y Tudor, 1989; Canevari *et al.* 1991). Lougheed (1991) la da a conocer para Tucumán y Moschione y San Cristóbal (1993) para la Isla

Cañete, Misiones, cerca del límite con Corrientes.

AGRADECIMIENTOS

A Adolfo Beltzer y Carlos Virasoro por brindar bibliografía y su permanente estímulo.

REFERENCIAS

- Bergkamp, P. Y.** 1992-1993. Shore birds in San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. Spring 1992- Autumn 1993. *Inst. Systematics a Population Biology*. Univ. Amsterdam, Netherlands, 56 pp.
- Canevari, M., P. Canevari, G. R. Carrizo, G. Harris, J. Rodríguez Mata y R. J. Straneck.** 1991. Nueva Guía de las Aves Argentinas. *Fund. Acindar*, Buenos Aires, Tomo I, 411 p. + índice 1-20, Tomo II, 497 p. + índice 1-20.
- Contreras, J. R.** 1987. Lista Preliminar de la Avifauna Correntina. II. Passeriformes. *Hist. Nat.* 7:24-25.
- Contreras, J. R., L. M. Berry, A. O. Contreras, C. Bertonatti y E. Utges.** 1990. Atlas Ornitológico de la Provincia del Chaco, República Argentina. I. No Passeriformes. *Cuadernos Técnicos Félix de Azara*, 1, 164 p. + 1 mapa.
- Chébez, J. C.** 1992. Notas sobre algunas aves poco conocidas o amenazadas de Misiones (Argentina). *Aprona, Bol. Cient.* 21:12-30.
- Darrieu, C. A.** 1984. Estudios sobre la Avifauna de Corrientes II. Dos Nuevos Registros de *Sporophila* para la Provincia. *Neotrópica* 30:161-162.
- De la Peña, M. R.** 1978. Enciclopedia de las Aves Argentinas 4. *Ed. Colmegna*, Santa Fe:131-174.
- De la Peña, M. R.** 1989. Guía de Aves Argentinas. Tomo VI. *Ed. Lux*, 125 p.
- De la Peña, M. R.** 1994. Guía de Aves Argentinas. Tomo III. *Ed. L.O.L.A.*, Buenos Aires, 142 p.
- Esteban, J. G.** 1947. Sobre dos especies de troquílidos nuevos para la Argentina. *Acta Zool. Lilloana* 4:107-113.
- Glai, A.** 1950. Notas de Viajes. *Hornero* 9:121-164.
- Giraudo, A. R., J. L. Baldo y R. R. Abramson.** 1993. Aves observadas en el suroeste, centro y este de la Provincia de Misiones, con la mención de especies nuevas o poco conocidas para la provincia. *Nótulas Faunísticas* 49:1-13.
- Haene, E. y C. Ostrosky.** 1993. El Suirirí Boreal (*Tyrannus tyrannus*) en San Juan. *Nuestras Aves* 10(28):29.
- König, C.** 1979. Presencia de *Tyrannus tyrannus* en Misiones. *Hornero* 12:55-56.
- Lougheed, S.** 1991. Nueva localidad para la Corbatita Ala Blanca *Sporophila leucoptera* (Vieillot). *Nuestras Aves* 9(24):25.
- Léveque, R.** 1978. Première observation du Tyrant Tritri *Tyrannus tyrannus* aux îles Falklands. *Alauda* 46:362.
- Meyer de Schauensee, R.** 1966. The species of birds of South America and their distribution. *Philadelphia Acad. Nat. Sci.* 577 pp.
- Meyer de Schauensee, R.** 1982. A guide to the birds of South America. *Philadelphia Acad. Nat. Sci.* 498 pp.
- Morrison, R. I. G. y R. K. Ross.** 1989. Atlas of Nearctic shorebirds on the coast of South America. Vol. 2. *Canadian Wildl. Serv.* 325 pp.
- Moschione, F. N. y J. San Cristóbal.** 1993. Hallazgo del Corbatita Blanco (*Sporophila leucoptera*) en Isla Cañete, provincia de Misiones. *Nuestras Aves* 10(28):25.
- Narosky, S.** 1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. *Hornero* 12:122-126.
- Narosky, S. y D. Yzurieta.** 1987. Guía de las Aves de Argentina y Uruguay. *Asoc. Ornít. Plata*, Buenos Aires, 345 p.
- Navas, J. y N. Bó.** 1986. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. I. *Neotrópica* 87:43-44.

- Nores, M. y D. Yzurieta. 1980. Aves de Ambientes Acuáticos de Córdoba y Centro de Argentina. *Sec. Est. Agric. y Gan., Córdoba*, 236 p.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1986. Nuevas localidades para Aves argentinas. Parte VII. *Hist. Nat.* 6:49-52.
- Nores, M., D. Yzurieta y R. Miatello. 1983. Lista y Distribución de las Aves de Córdoba, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Cienc. (Córdoba)* 56:i-ix + 1-114.
- Nores, M., D. Yzurieta y S. Salvador. 1991. Lista y Distribución de las Aves de Santiago del Estero, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Cienc. (Córdoba)* 59:157-196.
- Olog, C. C. 1959. Las Aves Argentinas. Una Guía de Campo. *Inst. Miguel Lillo*, Tucumán, 343 p.
- Olog, C. C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. *Opera Lilloana* 9:1-377.
- Olog, C. C. 1968. Las aves sudamericanas. Una guía de campo. Tomo I. *Inst. Miguel Lillo*, Tucumán, 493 p. + Lám. 1-73.
- Olog, C. C. 1979. Nueva Lista de la Avifauna Argentina. *Opera Lilloana* 27:1-324.
- Olog, C. C. 1984. Las Aves Argentinas. Una Nueva Guía de Campo. *Ed. Incafo*, Madrid, 325 p.
- Partridge, W. H. 1963. Nota sobre una nueva ave para la fauna argentina. *Neotrópica* 9:64.
- Ridgely, R. S. y G. Tudor. 1989. The birds of South America. Vol. I. The Oscine Passerines. *Oxford Univ. Press*, i-xvi + 1-516 pp.
- Ridgely, R. S. y G. Tudor. 1994. The birds of South America. Vol. II. The Suboscine Passerines. *Oxford Univ. Press*, i-xii + 1-814 pp.
- Rovira, P. y A. Beltzer. 1992. *Polytmus guainumbi*, Picaflor de Antifaz (Aves: Trochilidae), una nueva especie para la provincia de Entre Ríos. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 23:71-72.
- Salvador, S. A. y P. G. Eroles. 1994. Notas sobre Aves de Santiago del Estero. *Nuestras Aves* 12(30):24-25.
- Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 1990. Nuevos hallazgos en Argentina de *Anas discors*, *Lophornis chalybea* y *Tyrannus tyrannus*. *Hornero* 13:178-179.
- Short, L. L. 1971. Aves nuevas o poco comunes de Corrientes, Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. (Zool.)* 9:283-309.
- Short, L. L. 1975. A zoogeographic analysis of South American Chaco avifauna. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 154:163-352.
- Sick, H. 1984. Ornitología brasileira, uma introdução. 2 vol. 827 pp., *Ed. Univ. de Brasília*.
- Zotta, A. 1939. Otras adiciones a la avifauna argentina. *Hornero* 7:243-255.
- Zotta, A. 1940. Lista Sistemática de las Aves Argentinas. *Sec. Ornit. M.A.C.N., Hornero* 7:447-472.