



Natura Neotropicalis 36: 79-80 (2004)



Palabras clave: *Pipraeidea melanonota*, Entre Ríos, nueva cita.

Key words: *Pipraeidea melanonota*, Entre Ríos, new record

Primer registro de *Pipraeidea melanonota melanonota* para la provincia de Entre Ríos, Argentina. (Aves: Emberizidae: Thraupinae)

Abel R. P. Zapata

División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata. Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina.

RESUMEN

En esta nota se da a conocer por primera vez para la provincia de Entre Ríos a *Pipraeidea melanonota melanonota*.

ABSTRACT

First record of *Pipraeidea melanonota melanonota* from Entre Ríos Province, Argentina.

In this paper *Pipraeidea melanonota melanonota* is reported for the first time at Entre Ríos Province.

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) presenta una amplia distribución en Sudamérica, donde se encuentra representada por dos subespecies: *P. melanonota melanonota* (Vieillot, 1819) y *P. melanonota venezuelensis* (Sclater, 1857). Esta última se encuentra presente en Venezuela (selvas de la zona subtropical), Colombia, Brasil septentrional, Ecuador, Perú, Bolivia. En nuestro país ingresa por el noroeste

encontrándose en la zona subtropical, provincias de Jujuy, Salta y Tucumán (Olog, 1963).

P. melanonota melanonota está citada para el sudeste de Brasil (Bege 1996), este de Paraguay (Contreras y Contreras, 1993) y Uruguay (Tremoleras, 1920; Cuello y Gerzenstein, 1962; Gore y Gepp 1978 y Arballo, 1990). En Argentina fue registrada para las provincias de Misiones, Corrientes y Buenos Aires (Hartert y Venturi, 1909; Dabbene, 1910; Hellmayr, 1936; Pereyra, 1938; Darrieu y Camperi, 1988; Ridgely & Tudor 1989; Moschione y San Cristóbal, 1991; Contreras y Contreras, 1993; Giraudo *et al.*, 1993; Delhey y Carrete, 1999; Camperi y Darrieu, 2001; Döke, 2001).

Se da a conocer el primer registro de *P. m. melanonota* para la provincia de Entre Ríos en la localidad de Gualeguaychú, para la cual no existían registros.

Una pareja de esta especie fue observada en reiteradas oportunidades entre el día 20 de enero y 10 de febrero de 1998, en el área urbana de la ciudad de Gualeguaychú (32°29'S; 59°40'O), ubicada en el sudeste de la provincia de Entre Ríos, Distrito Uruguayense, Provincia Pampeana (Cabrera y Willink, 1973); esta provincia biogeográfica tiene clima templado cálido y precipitación media anual entre 1000 y 600 mm (Cabrera, 1976). Cuenta con vegetación de pradera en tanto que la franja E, en adyacencia del río Uruguay, es una selva tipo subtropical austrobrasileño-uruguayo, que se extiende a los ríos interiores (Báez, 1937).

Los ejemplares fueron registrados en un sector de árboles y arbustos cultivados en cuyo follaje se desplazaban entre 2 y 3 m de altura, alcanzando en las ramas terminales posibilitando su identificación con prismáticos 10X50. El monte está integrado por especies autóctonas: *Acacia caven* como dominante, *Prosopis* sp., *P. algarrobilla*, *Celtis spinosa*, *Scutia buxifolia* y *Bahuinia candidans* a las que se suman *Tropaeolum pentaphyllum*, *Pasiflora caerulea*, *Tillandsia aernanthos*, *T. usneoides* y en pequeños espacios con aguas temporarias muy someras, crece *Solanum glaucum*.

P. m. melanonota es citada como ocasional para el NE de la provincia de Buenos Aires, (Narosky y Di Giácomo 1993), no obstante conocerse citas para el área. Además, existen registros para Bahía Blanca (Delhey y Carrete, 1999) y Necochea (Doke, 2001) y las provincias de Corrientes y Misiones. No fue encontrada hasta ahora en la provincia de Entre Ríos (Contreras y Contreras, 1993). Respecto al ingreso de *P. m. melanonota* en esta provincia se podría suponer que se habría producido desde el Uruguay utilizando la continuidad florística representada por la selva



marginal, el monte subserófilo y plantaciones arbóreas a las que se intercalan parcelas de pradera gramínea; formaciones que existen casi ininterrumpidamente sobre ambas márgenes del río.

REFERENCIAS

- Arballo, E. 1990. Nuevos registros para la avifauna uruguaya. *El Hornero* 13 (2): 179-187.
- Báez, J. R. 1937. Mapa fitogeográfico de la provincia de Entre Ríos. *GAEA* 5: 65.
- Bege, L. A. do R. 1996. As Aves em Santa Catarina. Distribuição geográfica e Meio Ambiente Florianópolis. *FATMA*, Brasil. 326p.
- Cabrera, A. L. y A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. Serie Biología, *Monografía 13, O.E.A.*, Washington, D.C., 120 p
- Cabrera, A. L. 1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. 2da. Ed. T2 (1), *Acme S.A.C.I.*, Buenos Aires, 505 p.
- Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2001. Estudio de una colección de aves del sur de la provincia de Misiones República Argentina. *Physis C.*, 58 (134-135): 79-83
- Contreras, J. R. y A. O. Contreras. 1993. Acerca de la distribución de *Pipraeidea melanonota* (Vieillot, 1819) en la República del Paraguay y en el norte argentino (Aves Emberizidae: Thraupinae). *Nótulas Faunísticas* 46: 1-4
- Cuello, J. y E. Gerzenstein. 1962. Las aves del Uruguay. Lista sistemática, distribución y notas *Com. Zool. Mus. Hist. Nat. Montev. 6* (93): 1-240.
- Dabbene, R. 1910. Ornitología Argentina. *An. Mus. Nac. Buenos Aires* 18: 1-513.
- Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1988. Estudio sobre la avifauna de Corrientes. V. Passeriformes poco citados (Parulidae, Thraupidae). *Neotrópica* 36 (92): 133-137.
- Delhey, J. K. y M. Carrete. 1999. Aves nuevas o poco conocidas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 40:11-12
- Doke, J. D. 2001. Viuva (*Pipraeidea melanonota*) en Necochea, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 41: 34.
- Giraud, A. R., J. L. Baldo y R. R. Abramson. 1993. Aves observadas en el Sudoeste, centro y este de Misiones (República Argentina) con la mención de especies nuevas o poco conocidas para la provincia. *Nótulas Faunísticas* 49: 1-13.
- Gore, M. E. y A. R. M. Gepp. 1978. Las Aves del Uruguay. *Mosca Hnos.* Montevideo.
- Hartert, E. y S. Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novit. Zool.* 16: 159-267
- Hellmayr, C. E. 1936. Catalogue of the birds of the Americas. Part IX. Tersinidae-Thraupidae. *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.*, 13 (9): 77-79.
- Moschione, F. N. y J. San Cristóbal. 1991. Nuevas observaciones de la Viuva, *Pipraeidea melanonota* en la ribera platense. *Garganchillo* 11: 10.
- Narosky, S. y A. G. Digiaco. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus AOP. *Vázquez-Mazzini-L.O.L.A.* Buenos Aires, 128 p.
- Olrog, C. C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. *Opera Lilloana* 9, 377p.
- Pereyra, J. A. 1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. *Mem. Jardín Zool. La Plata* 9, 304 p.
- Phelps, W. H. y W. H. Phelps Jr. 1963. Lista de las aves de Venezuela con su distribución. 1 (2). 427 p.
- Ridgely, Y. R. S. & G. Tudor. 1989. The Birds of South America. Volume 1. The Oscine Passerines. *Univ. Texas Press*, Austin, 516 pp.
- Tremoleras, J. 1920. Lista de las aves uruguayas. *El Hornero* 2: 10-25.

Recibido / Received: 02 abril 2004
Aceptado / Accepted: 10 enero 2006